



JEUNE ENFANT < 7-8 ans : Spray + Chambre d'inhalation +++. Avec le masque < 4 ans. Sans le masque > 4 ans

Limite d'âge	Molécule	Nom c ^{al}	Forme	Dosage	Nbre dose/spray	Poso faible	Poso normale	Poso forte
aucune	Béclométhasone	Bécotide®	Spray	250µg	200	1b/j	1bX2/j	2bX2/j
aucune	Béclométhasone	Béclospin®	Nébulisat°	400 µg (1ml) ; 800 µg (2ml) ⁽¹⁾		400 X 1/j	400 X 2/j	800 X 2/j
aucune	Fluticasone	Flixotide®	Spray	50-125 µg	120	50:1bX2/j	50: 2X2b	125:2bX2/j
À partir 4 ans	Flutic. + Salmétérol	Sérétide®	Spray	50-125 µg	120	50:1bX2/j	50: 2bX2/j	125:2bX2/j
aucune	Budésonide	Pulmicort®	Nébulisat°	0,5-1g/2ml ⁽¹⁾	20/boite	0,5mg X 1/j	0,5mg X2/j	1mg X2/j
À partir 6m-6A	Montélukast	Singulair®	Granulés ⁽²⁾	4mg	28	1cp/j	1X/j	1X/j
À partir de 6A-14A	Montélukast	Singulair®	Cp à croquer ⁽³⁾	5mg	28	1cp/j	1X/j	1X/j

(1) : avec un nébulisateur pneumatique + masque < 4-5 ans ou embout buccal > 4-5 ans. 2ml sont suffisants pour nébuliser. Ne pas ajouter de sérum physio.

(2) : directement dans la bouche ou mélangés avec une cuillère de nourriture de préférence semi-liquide froide ou à température ambiante (compote de pommes, glace, carottes et riz par exemple) sans tenir compte du moment de l'ingestion alimentaire.

(3) : à distance des repas : au moins 1 heure avant ou 2 heures après la prise alimentaire.

GRAND ENFANT >7- 8 ans : Système d'inhalation avec poudre, après vérification de la technique d'inhalation +++ (expiration, puis inspiration à fond, bloquer en comptant jusqu'à 10)

Limite d'âge	Molécule	Nom c ^{al}	Forme	Dosage	Nbre doses	Poso faible	Poso normale	Poso forte
7-8 ans	Fluticasone	Flixotide®	Diskus®	100-250 µg	60	100:1bX1/j	100: 1bX2/j	250:1bX2/j
8 ans	Budésonide	Pulmicort®	Turbuhaler®	100-200 µg	200	100:1bX2/j	200 X 1bX2/j	200:2bX2/j
8 ans	Budésonide	Novopulmon®	Novolizer®	200-400 µg	200	200:1b X 1/j	200: 1bX 2/j	200:2bX 2/j
8 ans	Flutic. + Salmétérol ⁽¹⁾	Sérétide®	Diskus®	100-250 µg	60	100:1bX1/j	100: 1bX2/j	250:1bX2/j
8 ans	Bud. + Formotérol ⁽²⁾	Symbicort®	Turbuhaler®	100-200 µg	120	200:1bX2/j	200: 1bX2/j	200:2bX2/j
À partir 6A-14A	Montélukast	Singulair®	Cp à croquer ⁽³⁾	5mg	28	1X/j	1X/j	1X/j
À partir de 15A	Montélukast	Singulair®	Cp pelliculé ⁽³⁾	10mg	28	1X/j	1X/j	1X/j

(1) Délai d'action « lent » ≈ 6 min.

(2) : Délai d'action rapide ≈ 2 min. ≈ B2 courte durée d'action.

(3) : à distance des repas : au moins 1 heure avant ou 2 heures après la prise alimentaire.